

ગાય-ભેંસમાં રસીકરણ સમય-પત્રક

રસીકરણ - સમય પત્રક

ક્રમ	રોગ	પ્રથમ ડોઝ	બીજો ડોઝ	મહિનો
૧	કાળીયો તાવ	૬ મહિને	દર વર્ષે	ફેબ્રુઆરી-માર્ચ
૨	ગાંઠિયો તાવ	૬ મહિને	દર વર્ષે	જૂન
૩	ચેપી ગર્ભપાત	૬-૮ મહિને (જીવનમાં એક જ વાર)	ફક્ત વોડકીઓ / પાડીઓમાં	કોઈ પણ સમયે
૪	ખરવા-મોંવાસા	૬ મહિને	દર વર્ષે	નવેમ્બર-ડિસેમ્બર
૫	ગળસુંઢો	૬ મહિને	દર વર્ષે	એપ્રિલ-મે
૬	થાઈલેરીયોસીસ	૨ મહિના પછી	દર વર્ષે	ડિસેમ્બર-ફેબ્રુઆરી
૭	હડકવા	-	કુતરું કરડ્યા પછી	૦, ૩, ૭, ૧૪, ૨૮, ૬૦ દિવસે

★ રસીકરણ કરાવતાં પહેલા કૂમિનાશક દવા અવશ્ય આપવી.

યાદ રાખો :

- નવજાત વાઇરડાં / પાડાંને વિયાયા બાદ અડધાથી એક કલાકમાં ખીરું પીવડાવી દેવું.
- દુધાળા પશુઓને દૂધ ઉત્પાદનના ૫૦% પ્રમાણે દાણ આપવું સાથે શરીર નિભાવ માટે ૧-૨ કિલો દાણ વધારનું આપવું.
- ૨૧ દિવસના અંતરાળે ગાય / ભેંસમાં ગરમીના ચિંહોને કાળજીપૂર્વક નિછાળી ફળાવી દેવી.
- સંકર વોડકીઓને ૧૮-૨૪ મહિને અને ભેંસની વોડકીઓને ૨૮-૩૩ મહિને ફળાવી દેવી.
- ગાય / ભેંસ ગરમીમાં આવ્યા બાદ ૧૨-૧૮ કલાકમાં કૃત્રિમ બીજદાન કરાવી દેવું.
- ગાય / ભેંસ વિયાયા બાદ ૮૦-૧૦૦ દિવસમાં ફળાવી દેવી જેથી બે વિયાણ વચ્ચેનો ગાળો ઘટાડી શકાય.
- ફળાવ્યાના ૭૫-૮૦ દિવસ બાદ ગર્ભ નિદાન પરીક્ષાણ કરાવી દેવું.
- સમયસર ચેપીરોગો જેવા કે ગળસુંઢો, ગાંઠિયોતાવ, ખરવા-મોંવાસા, ગર્ભપાત વગેરેની સામે રસીકરણ કરાવવું.

-: પ્રકારાક :-

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક

કામધેનુ યુનિવર્સિટી, કર્મયોગી ભવન,

બ્લોક-૧, ૪થો માળ, વીંગ-બીંગ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

